



Au cours de la dialyse votre bras doit rester inerte afin de garder les aiguilles bien en place.

Aussi évitez :

- De toucher le champ stérile et les sites d'injection,
- De tirer ou serrer les lignes,
- De manipuler les pansements, les clips ou les connexions. Attendre le feu vert de l'infirmière(e) pour les retirer
- De changer de position seul (n'hésitez pas à appeler les infirmières)

Pour **VOTRE SECURITE**, restez **VIGILANT**

Rappel des consignes :



hygiène des mains



1 Paume sur paume:
Désinfection des palmes



2 Paume sur dos:
Désinfection des doigts et des espaces interdigitaux



3 Doigts entrelacés:
Désinfection des espaces interdigitaux et des doigts



4 Paume/doigts:
Désinfection des doigts



5 Pouces:
Désinfection des pouces




6 Ongles:
Désinfection des ongles



7 Poignets

*une autre façon de
prendre soin de sa fistule,
c'est de ne pas
contaminer son
environnement
en se désinfectant
les mains*



La Gazette du patient

N°5
Avril 2025

AuraSanté



Sommaire

- Consignes en cours de séance
- Sécurité et surveillance
- Restez vigilant
- Consignes hygiène des mains



La Gazette du patient : éditée par AuraSanté - Rue M. Marvingt - 63118 Cébazat
Rédaction des sujets : Groupe Abord Vasculaire / IPA - Pôle Qualité - Service Communication
Directeur de Publication : M. Bernard Bayle - Parution : Avril 2025
Ne pas jeter sur la voie publique

AuraSanté

V4-2025

En séance

Pour votre sécurité... Restez branché



La désinsertion d'aiguille de fistule ou cathéter en séance de dialyse n'est pas rare et peut être potentiellement grave.

Elle peut passer inaperçue et occasionner des pertes sanguines importantes en quelques secondes nécessitant une transfusion ou une hospitalisation et dans les cas les plus graves conduire au décès.



2024

9 cas de désinsertions

7 auraient
pû être évitées

2 ont nécessité
une hospitalisation



En 2024, 9 cas de désinsertion ont été rapportés toutes dues à un manque de vigilance des patients lors de mouvements (tentative de se lever seul, retournement dans le lit/fauteuil, manipulations des lignes et des pansements...).

Dans 2 cas, les patients ont dû être hospitalisés, 1 pour surveillance et le deuxième pour changer son cathéter.


Pour votre sécurité et une meilleure surveillance



- ✓ Les lignes doivent être fixées à vos vêtements et non au matelas ou au fauteuil
- ✓ Le bras doit être visible pendant la séance
- ✓ Les lignes ne doivent pas être fixées dans la main mais faire une boucle au-dessus du poignet



Visibilité du bras



Fixation des lignes



Fixation des lignes